

Nome scientifico; *Lycaena dispar*

Nome volgare Licena delle paludi

Dimensioni: apertura alare 35-45 mm. Femmina generalmente più grande del maschio.

Descrizione: piccola farfalla dal forte impatto visivo per la sua vivace livrea. Maschio, molto vistoso, per via delle ali color arancione-rame brillante con margini scuri. La femmina, invece, presenta pagina superiore delle ali con numerose macchie marroni e margini bruni più estesi.

La pagina inferiore delle ali è simile per entrambi i sessi, grigio-azzurra con fascia arancione e macchie nere, quella posteriore, e arancione vivace quella anteriore. E' proprio il colore di fondo arancione così vivace che distingue, a prima vista, questa Licena da altre specie affini.

Distribuzione e habitat: *Lycaena dispar*, con la sottospecie *L. dispar rutilus*, è presente, in Italia, nelle pianure del nord ed in alcune aree della Toscana.

Frequenta prati umidi, acquitrini, paludi e canali. Causa degradazione e distruzione del suo habitat, con conseguente riduzione della sua pianta nutrice, il *Rumex* (Romice), questa farfalla è divenuta minacciata e rara su tutto l'areale di distribuzione.

Periodo di attività: gli adulti sono presenti, da maggio a settembre, in 2 generazioni.

